

Rosenschnitt-Kurs Ettenbühl 8. Mai 2003

Meine Notizen – contact: garten@pangolin.li

Moscata-Hybriden

meist ein langer Trieb, Blüten zuoberst
nach erster Blüte auf Knie/Hüfthöhe schneiden, 6 Wochen später neue Blüte
im Winter Heckenscherenschnitt auf Kniehöhe
viele kleine Triebe stehen lassen
Betrifft: Felicia, Buff Beauty, Lady Scarman, Penelope, Cornelia

Portland/Einmalblühende Alte Rosen

Kugelförmig schneiden, viele kleine Triebe stehen lassen
Betrifft: Comte de Chambord, Rose de Rescht

Bourbon-Rosen

langwachsend - build up in stages
vegetative Triebe früh ausschneiden
langsam wachsen lassen, stark zurückschneiden, jedes Jahr 10-15 cm länger lassen
Betrifft: Souvenir de la Malmaison, Louise Odier, Mme. Isaac Pereire, Zéphirine Drouhin

Einmalblühende Rosen

Winterschnitt immer auf selbe Höhe, architektonisch schneiden
Sommer - Vegetative Triebe: bei Blütenbildung auf Höhe der Blüten (oder tiefer) schneiden. Bei Hagebuttenansatz ca. Ende August nochmals schneiden.

Kletterrosen

3-4 Triebe lang lassen, fächerförmig, flach anliegend, nicht überkreuzend an waagrechten Drähten befestigen, Schnur dabei zweimal um Draht wickeln
1-2 feinere Triebe kurz schneiden, wie Strauchrose - deckt Stamm ab
Heckenscherenschnitt parallel zur Wand, 10 cm
Hagebutten rausschneiden, bis Wand bedeckt ist
Einmalblüher im März einmal schneiden

Schnitt bestimmter Scarman-Rosen

Scarman's Himalayan Musk:
Grundsätzlich einmal im März schneiden, störende Zweige laufend entfernen. Untere Regionen besonders dicht halten. Einmalblühend, d.h. mit Blush Noisette kombinieren, schwächerer öfterblühend

Brewood Belle:

Im September stark schneiden, im Frühling nur kosmetisch nachschneiden

Für Geländer, Zäune

Barbier-Rambler oder Gervais-Rambler, wachsen gerne waagrecht.

Allgemein Junge Rosen - 3-4 a

Hagebutten immer schneiden

Spritzen, Düngen

In Ettenbühl ab mitte März - ab Austreiben der Augen - alle 2 Wch. (privat auch seltener)
Baymat und Saprol abwechseln, um Rost, Sternrusstau und Mehltau optimal zu bekämpfen
Ettenbühl Dünger: April - Oktober (ausser bei grosser Hitze)
Künstlicher Dünger: weichere Triebe